

Prevení la picadura, prevení la enfermedad

Fiebre Amarilla

- Por la picadura de mosquitos infectados (*Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, *Haemagogus*, *Sabethes*).
- El mosquito se infecta al picar a una persona o animal enfermo en etapa de viremia.
- Zonas de riesgo en Argentina: Misiones, norte de Corrientes, Formosa, Chaco, Jujuy y Salta, limítrofes con Brasil, Paraguay y Bolivia.

- No se transmite de persona a persona.

Enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados (*Aedes* y *Haemagogus*). Su nombre alude a la ictericia —color amarillo de piel y ojos— causada por el daño hepático.

1. ¿Cómo se contagia?

2. ¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas aparecen entre 3 y 6 días después de la picadura.



3. ¿Cómo prevenimos?

Síntomas Iniciales

- Fiebre abrupta (más de 39 °C)
- Dolor de cabeza
- Escalofríos
- Náuseas y mareos
- Dolor muscular
- Malestar general

Etapa grave

- (15 al 25% de los casos):
- Ictericia (piel y ojos amarillos)
 - Vómito con sangre
 - Puede ser mortal si no se trata a tiempo



- Vacunarse si vive o viaja a zonas de riesgo
- Eliminar recipientes con agua estancada
- Usar y renovar repelente con frecuencia
- Vestir ropa clara, manga y pantalón largo
- Evitar espacios abiertos al atardecer y de noche



- Colocar mosquiteros en puertas y ventanas
- Avisar ante mortandad de monos en la zona
- Consultar al médico ante los primeros síntomas



Ante síntomas compatibles, acudir de inmediato al médico. La fiebre amarilla está considerada enfermedad profesional cuando el contagio ocurre en el ámbito laboral.

